

Số: /CNTY-CNTS

Lai Châu, ngày tháng 12 năm 2022

V/v hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống đói, rét cho động vật nuôi, thủy sản

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;
- Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ tháng 12/2022 và đầu năm 2023 hiện tượng rét đậm, rét hại có thể kéo dài và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối hoặc mưa rét và nhiều diễn biến phức tạp ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Thực hiện Công văn số 4500/UBND-KTN ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trong thời gian tới; Công văn số 2139/TCTS-NTTS ngày 05/12/2022 của Tổng cục Thủy sản về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản; Công văn số 845/CN-MTCN ngày 19/10/2022 của Cục Chăn nuôi về việc chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi; Công văn số 2447/SNN-CNTY ngày 14/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ động phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông xuân năm 2022 - 2023.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết, khí hậu gây ra. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ đạo, phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản tới các cơ sở, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cụ thể như sau:

1. Các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm

a) Đối với trâu, bò

- Chuồng trại: Chủ động gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, chuẩn bị bạt, phen để che chắn, giữ ấm và khô nền chuồng, đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi trong những ngày mưa, rét. Chuẩn bị đèn sưởi hoặc dự trữ chất đốt: củi, trấu, mùn cưa để đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Thức ăn: Tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp có thể làm thức ăn cho gia súc; thường xuyên kiểm tra việc bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô; thực hiện chế biến thức ăn để tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn như: ủ chua, rơm ủ urê... Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), khoáng, vitamin để bổ sung dinh dưỡng cho gia súc trong những ngày giá rét.

- Chăm sóc nuôi dưỡng: Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, nhất là bê, nghé cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để tăng cường sức đề kháng phòng chống đói, rét và dịch bệnh; đối với trâu, bò già yếu nên có kế hoạch vỗ béo sớm để giết thịt làm thực phẩm.

+ Đảm bảo cung cấp đủ lượng thức ăn thô xanh cho trâu, bò (cỏ xanh, thân, lá ngô, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ urê, thân cây chuối thái nhỏ); có thể bổ sung thêm thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) từ 0,5-1kg/con/ngày (tùy theo trọng lượng gia súc); đồng thời cung cấp đủ nước uống sạch.

+ Bổ sung muối ăn với lượng 15g/ngày (tương đương với 3 thìa cà phê) bằng cách hoà vào nước uống (nước ấm là tốt nhất) cho trâu, bò uống.

+ Không thả rông trâu, bò trong rừng; phải chủ động đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt, trong chuồng kín gió, nền chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm, ngày mưa, rét đậm, rét hại; mặc áo chống rét bằng bao tải gai, bao tải dứa, chăn chiên cũ... để giữ ấm cho trâu bò (lưu ý áo phải được giữ khô). Không cho trâu, bò làm việc, chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới 12⁰C.

- Thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin thiết yếu cho trâu, bò như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng...

b) Đối với lợn

- Chuồng trại vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để tồn đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa nhất là vào ban đêm; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét, nhiệt độ xuống dưới 12⁰C.

- Cho uống đủ nước sạch, bổ sung thêm các vitamin tổng hợp, men tiêu hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Han-Iodine, Virkon, Benkocid, Vetvaco Iodine... hoặc rắc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng một số loại vắc xin thiết yếu cho lợn như: Dịch tả lợn cổ điển, Tụ huyết trùng, Tai xanh...

c) Đối với gia cầm

- Chuẩn bị đầy đủ phên, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gia cầm; cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hoá để nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chống rét, dịch bệnh.

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng, đảm bảo chuồng nuôi không bị ẩm ướt.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Han-Iodine, Virkon, Benkocid, Vetvaco Iodine... hoặc rắc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ một số loại vắc xin cho đàn gia cầm như: Tụ huyết trùng, cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, đậu, Dịch tả vịt, viêm gan do vi rút,...

2. Các biện pháp phòng chống rét cho thủy sản nuôi

- Đối với các ao nuôi thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện chống rét cần tổ chức thu hoạch sớm để không xảy ra hiện tượng cá bị chết rét (đặc biệt các đối tượng như: cá rô phi, cá Chim trắng, cá Diêu hồng, cá chuối hoa... do khả năng chịu rét kém).

- Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra cá hoặc thu hoạch theo cách đánh tĩa thả bù, tránh để cá bị xây sát tạo điều kiện cho nấm và ký sinh trùng xâm nhập, gây bệnh cho cá.

- Đối với thủy sản đang nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm, đàn cá bố mẹ, cơ sở lưu giữ cá giống qua đông áp dụng một số biện pháp chống rét sau:

+ Giữ mực nước từ 2m trở lên để ổn định nhiệt độ.

+ Đào hố sâu 2,5 -3 m, rộng 3- 4m² ở nơi khuất gió hoặc phía Bắc để làm nơi trú ẩn và chống rét cho cá.

+ Sử dụng sọt đan bằng tre, nứa có chứa các túi rơm làm ổ đim dưới đáy ao để làm nơi trú ẩn và chống rét cho cá.

+ Thả bèo tây hoặc bè rau muống với diện tích khoảng 1/2 -2/3 diện tích mặt ao về hướng Bắc hoặc đầu gió để chắn gió.

+ Đối với cơ sở nuôi có điều kiện: làm khu vực có che phủ bề mặt ao bằng nilon sáng màu để ngăn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt độ cho nước ao nuôi.

+ Hàng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa phân hữu cơ, vô cơ xuống ao. Sử dụng vôi bột với lượng 2-3 kg/100m³ hòa vào nước sau đó té đều xuống ao, làm định kỳ 15-20 ngày/1 lần để khử trùng nước ao nuôi, phòng bệnh cho cá (hoặc dùng một số loại hóa chất được phép sử dụng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để khử trùng nước ao nuôi). Thường xuyên quan sát, phát hiện các biểu hiện bất thường trong ao nuôi để tìm biện pháp xử lý kịp thời.

+ Đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè có thể sử dụng các loại nilon sáng màu để phủ kín mặt lồng nuôi hoặc thả sâu lồng nuôi từ 2 - 2,5 m so với mặt nước, di chuyển lồng, bè đến nơi kín gió.

+ Cần tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho cá để cá khỏe mạnh, có sức đề kháng với bệnh tật và tăng khả năng chống chịu được với thời tiết lạnh kéo dài. Vào thời điểm nắng ấm, tranh thủ cho cá ăn trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 15h chiều, cần cho cá ăn nhiều hơn theo nhu cầu nhưng cho cá ăn no thì thôi (tránh thừa thức ăn gây ô nhiễm). Trong thức ăn cần phải thường xuyên bổ sung vitamin C với lượng từ 3 - 5 gram/kg thức ăn để tăng sức đề kháng cho vật nuôi chống lại giá rét. Khi nhiệt độ nước xuống dưới 18⁰C, giảm 1/2 lượng thức ăn cho cá ăn (khẩu phần cho cá ăn khoảng 1,5 - 2% trọng lượng cá). Khi nhiệt độ xuống dưới 15⁰C, dừng cho cá ăn. Thường xuyên theo dõi ao nuôi hàng ngày, phát hiện các hiện tượng bất thường để kịp thời xử lý.

Trên đây là hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chính để phòng, chống đói, rét dịch bệnh cho động vật nuôi, thủy sản của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đề nghị các phòng, đơn vị chuyên môn các huyện, thành phố quan tâm thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn người dân triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên phối hợp đôn đốc, giám sát, kiểm tra tại cơ sở hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vật nuôi, thủy sản do đói, rét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CNTS.

CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Anh Hùng