

Số: /SNN-TT&BVTV
V/v tăng cường công tác phòng chống sâu,
bệnh hại lúa Mùa năm 2023

Lai Châu, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Vụ mùa 2023 toàn tỉnh gieo cấy 22.947 ha, đạt 100,5% KH. Lúa trà sớm đang giai đoạn trổ - chín sữa, trà chính vụ giai đứng cái - làm đòng, trà muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh. Hiện tổng diện tích lúa nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại là 314 ha, diện tích áp dụng các biện pháp phòng trừ 255 ha. Trong đó: Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ 239 ha; ốc bươu vàng 19 ha; tập đoàn rầy 1,0 ha; sâu đục thân 1ha; bệnh đạo ôn lá 24 ha; bệnh đốm sọc vi khuẩn 27 ha...

Thời gian tới là cao điểm của các đối tượng sinh vật hại chính trên lúa mùa: Sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 gây hại mạnh từ giữa đến cuối tháng 8; Sâu đục thân lúa 4 gây hại mạnh từ nửa đầu tháng 8; bệnh đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen, chuột... Để hạn chế tối đa tác hại của sâu, bệnh gây ra, đảm bảo năng suất, chất lượng của lúa mùa. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị:

1. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phân công cán bộ bám sát đồng ruộng; điều tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại chính trên lúa, xác định mật độ, phạm vi phân bố trên từng khu vực, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cụ thể như sau:

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phun trừ khi mật độ sâu cuốn lá trên 25 con/m², phun khi sâu tuổi nhỏ bằng các loại thuốc có hoạt chất như: **Chlorfluazuron, Emamectin benzoate, Indoxacarb, Permethrin,...** phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày khi mật độ sâu cao trên 100 con/m².

+ Đối với sâu đục thân: Phun thuốc BVTV sau khi trưởng thành rộ 5-7 ngày đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh, giai đoạn lúa trổ phun trước và sau khi lúa trổ 3-5 ngày; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị sâu đục thân có chứa các hoạt chất như: **Thiosultap-sodium, Nereistoxin, Abamectin, Permethrin,...** để phun, nếu ruộng lúa bị nặng cần phun nhắc lại lần hai sau lần một 3-5 ngày, nên luân phiên thay đổi thuốc giữa các lần phun, phun vào lúc chiều mát tránh ảnh hưởng đến quá trình phơi màu của lúa.

+ Đối với tập đoàn rầy: Tiến hành phun trừ khi mật độ rầy >750con/m²; Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như **Thiamethoxam, Nitenpyram, Buprofezin, Fenobucarb, Pymetrozine, Imidaclopride, Chlorfenapyr,...** trong trường hợp mật độ rầy cao nên phun kép 2 lần, cách nhau từ 5-7 ngày.

+ Đối với bệnh đạo ôn: Theo dõi sát diễn biến của thời tiết và tình hình phát sinh của bệnh để hướng dẫn và chỉ đạo phòng chống, nhất là tại những

khu vực có nguy cơ cao (giống nhiễm, những diện tích thường nhiễm bệnh nặng trong các năm trước). Giám sát chặt chẽ phun phòng trước và sau khi lúa trổ. Sử dụng các thuốc có hoạt chất: *Isoprothiolane, Tricyclazole, Fenoxanil, Azoxystrobin,...*

+ Đối với bệnh lùn sọc đen: Giám sát chặt chẽ mật độ rầy lưng trắng, ở khu vực các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, thu thập mẫu rầy lưng trắng gửi giám định nguồn bệnh lùn sọc đen từ đó làm căn cứ để áp dụng các biện pháp trừ rầy kịp thời hiệu quả.

+ Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiến hành phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, phun kép 2 lần để có hiệu quả cao, lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: *Bismethiazol, Oxolinic acid, Chlorobromo isocyanuric acid,...*

+ Đối với chuột: Cần triển khai áp dụng các biện pháp diệt chuột trước giai đoạn lúa làm đồng - trổ, chín. Sử dụng một số thuốc chống đông máu thế hệ mới có hoạt chất *Brodifacoum, Bromadiolone, Diphacinone, Warfarin...*

Ngoài ra cần theo dõi các đối tượng khác như: Nhện gié, bọ xít dài, sâu keo, sâu cắn gié, bệnh khô vằn...

- Hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc lúa mùa, bón phân cân đối NPK để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm thiểu sự lây lan của các đối tượng sâu, bệnh hại; Sử dụng thuốc BVTV đảm bảo theo nguyên tắc “4 đúng”, thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng đúng quy định.

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, đánh giá tình hình sinh vật hại, tham mưu các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện, thành phố; Khuyến cáo các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV chỉ cung ứng những loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ nội dung Công văn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối kết hợp với các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng NN & PTNT các huyện, Phòng KT thành phố;
- Trung tâm dịch vụ NN các huyện, thành phố;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tổng Văn Dương