

Số: /SNN-TT&BVTV

Lai Châu, ngày tháng 5 năm 2024

V/v Chủ động phòng, trừ rệp sáp
bột hồng hại sắn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Hiện nay tổng diện tích cây sắn trên địa bàn tỉnh đạt trên 8.700 ha (Sìn Hồ 3.000 ha, Phong Thổ 2.795 ha, Mường Tè 700 ha, Nậm Nhùn 924 ha, Tam Đường 100 ha, Tân Uyên 500 ha, Than Uyên 500 ha, thành phố Lai Châu 30 ha) đang trong giai đoạn sinh trưởng thân lá.

Căn cứ kết quả giám định mẫu côn trùng số 24/BVTVPB-GĐ, ngày 27/5/2024 của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc, mẫu rệp hại trên cây sắn trên địa bàn huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu là Rệp sáp bột hồng (*Phenacoccus manihoti* Matile-Ferrero). Đây là đối tượng dịch hại nguy hiểm khó phòng trừ, lây lan nhanh, cây sắn bị hại có hiện tượng chùn ngọn, xoắn lá, cây bị lùn. Đặc biệt sau trồng từ 1,5 đến 2 tháng nếu bị nhiễm nặng rệp sáp bột hồng và thời tiết khô nóng cây sắn có thể bị chết hoặc năng suất giảm trên 50%.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rệp sáp bột hồng gây ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung điều tra, phát hiện rệp sáp bột hồng trên cây sắn, khoanh vùng và xử lý kịp thời triệt để tránh lây lan ra diện rộng.

- Tuyên truyền cho bà con nông dân cách nhận biết và tác hại của rệp sáp bột hồng và các loài sâu bệnh hại khác trên sắn. Hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ rệp sáp bột hồng theo “Quy trình phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng hại sắn” ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ/BVTV-KH, ngày 28/8/2020 của Cục trưởng cục Bảo vệ thực vật (có quy trình kèm theo).

- Thu gom và tiêu hủy các bộ phận của cây sắn đã bị nhiễm rệp sáp bột hồng bằng cách phơi khô sau đó đem đốt. Tuyệt đối không vứt bỏ hom sắn trên đồng ruộng và xung quanh bờ vì rệp sáp bột hồng có khả năng tồn tại và phát triển trên hom sắn.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: *Acetamiprid*, *Bifenazate*, *Carbosulfan*, *Carbosulfan + Chlorfluazuron*, *Dinotefuran + Imidacloprid*... để phun trừ rệp sáp bột hồng.

- Đối với những diện tích trồng sắn bị rệp sáp bột hồng hại nặng ở giai đoạn dưới 2 tháng cần xây dựng kế hoạch luân canh, chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác có giá trị.

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân nhận biết rệp sáp bột hồng và các biện pháp phòng trừ rệp sáp bột hồng trên cây sắn; tổng hợp diện tích nhiễm, đánh giá kết quả phòng trừ rệp sáp bột hồng trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh thuốc giả, thuốc không đảm bảo chất lượng và tăng giá thuốc.

Căn cứ nội dung Công văn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng NN & PTNT, Phòng Kinh tế TP;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tổng Văn Dương