

Số: /SNN-TT&BVTV

Lai Châu, ngày tháng 6 năm 2024

V/v Chủ động giám sát, chủ động phòng trừ châu chấu tre lưng vàng

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Chi cục: Kiểm Lâm, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Châu chấu là loài côn trùng đa thực có sức phá hại lớn, chủ yếu gây hại trên cỏ dại, rừng tre, vầu... Châu chấu còn non mới nở sống quần tụ trong phạm vi hẹp, di chuyển chậm và gây hại cục bộ, khi tuổi lớn sức gây hại tăng và có khả năng di chuyển sang gây hại các cây trồng nông nghiệp (lúa, ngô...) nếu không được phòng, trừ kịp thời.

Hiện nay, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La..) châu chấu tre lưng vàng đang phát sinh mạnh với mật độ cao và diện tích lớn. Tại Lai Châu năm 2020 và 2021 châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại trên cây trồng tại 2 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn. Tổng diện tích gây hại 10,5 ha (cây tre, nứa, chuối rừng); 01 ha lúa nương.

Để chủ động phòng chống châu chấu tre lưng vàng gây hại cây trồng, bảo vệ sản xuất, bảo vệ rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Đài phát thanh và Truyền hình, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về cách nhận biết, tác hại và các biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng, để người dân chủ động kiểm tra diện tích đồng ruộng, rừng; phát hiện và phòng trừ sớm khi châu chấu non mới nở, đồng thời báo ngay với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Khi phát hiện có ổ châu chấu mới nở, có mật độ cao cần khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp diệt châu chấu theo thứ tự: Sử dụng vợt bắt cho gia cầm ăn (trực tiếp hoặc chế biến), ngâm ủ thành phân hữu cơ hoặc đem tiêu hủy; sử dụng thuốc BVTV sinh học, hóa học để phun trừ (khi phun cần phun theo hình thức bao vây, cuốn chiếu để tăng hiệu quả); tổ chức các tổ, đội phun thuốc, dùng bình ắc quy, bình động cơ, hoặc bình phun thuốc dạng khói, phun quanh khu vực châu chấu non mới nở, sử dụng thuốc có hoạt chất như: **Imidacloprid**

(Anvado 100WP), *Thiosultap-sodium/Nereistoxin* (Neretox 95WP), *Emamectin benzoate* + *Lufenuron* (Lufen extra 100EC) để phun trừ. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, liều lượng và đúng cách).

2. Chi cục Kiểm lâm

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi địa bàn, phát hiện, nắm diễn biến tình hình di chuyển và gây hại của đàn Châu chấu trên các khu rừng vầu, tre, nứa, luồng...; kịp thời thông tin, báo cáo với UBND huyện chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, trừ sinh vật gây hại đến rừng tại địa phương không để lây lan trên diện rộng.

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố kiểm tra, nắm bắt tình hình; tham mưu, hướng dẫn các biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả; chủ động theo dõi sát tình hình châu chấu phát sinh tại các tỉnh lân cận để chủ động trong công tác tham mưu chỉ đạo phòng trừ.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện, thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh thuốc giả, thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tăng giá thuốc.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng NN & PTNT, Phòng Kinh tế thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tổng Văn Dương